



PRZYJĘCIE DO SZPITALA

NA ODDZIAŁ: Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

Informujemy, że przyjęcie do szpitala planowane jest..... o godz.

Na Centralną Izbę Przyjęć Pacjent stawia się na czczo.

Prosimy o zabranie:

Dowód osobisty	<input type="checkbox"/>
Dokumentacja medyczna (najlepiej kserokopie)	<input type="checkbox"/>
Wyniki badań (TK, Rezonans, RTG, USG,)	<input type="checkbox"/>
Wynik grupy krwi – oryginał lub potwierdzony odpis	<input type="checkbox"/>
Wykaz zażywanych leków wraz z dawkowaniem	<input type="checkbox"/>

Przybory toaletowe	<input type="checkbox"/>
Ręcznik	<input type="checkbox"/>
Pidżama 2 sztuki	<input type="checkbox"/>
Obuwie zmienne	<input type="checkbox"/>
Szućce, kubek, talerzyk	<input type="checkbox"/>
Woda mineralna niegazowana w małych butelkach z tzw. dziubkiem	<input type="checkbox"/>
Leki, które Pacjent zażywa (w oryginalnych opakowaniach)	<input type="checkbox"/>

Przygotowanie do zabiegu:

1. Kobiety prosimy o zmycie makijażu, lakieru z paznokci, usunięcie lakieru hybrydowego/żelowego.
2. Rzeczy wartościowe np. biżuteria prosimy pozostawić w domu.
3. Pacjent w dniu przyjęcia nie może być chory, przeziębiony (kaszel, katar, opryszczka).
4. Nie zaleca się aby Kobiety podczas pobytu były w trakcie miesiączki lub z terminem jej wystąpienia.

Przygotowanie do badania:

KOLONOSKOPIA:

Co zabrać?	Minimum 3 butelki (1,5l) wody niegazowanej, a dla pacjentów leżących w małych butelkach z „dziubkiem”
Jak się przygotować?	Stosować dietę bezresztkową, najlepiej płynną na 7 dni przed przyjęciem do szpitala.

ODSTAWIENIE LEKÓW P/ZAKRZEPOWYCH PRZED ZABIEGIEM/OPERACJĄ:

Uwaga! Odstawienie leków i włączenie heparyny drobnocząsteczkowej podskórnie odbywa się tylko i wyłącznie po konsultacji z lekarzem prowadzącym lub rodzinnym.

Heparynę drobnocząsteczkową stosuje się podskórnie w godzinach wieczornych.

Odstawienie Acenokumarol (Sitrom, Syncumar)	Na 5 dni przed ustaloną datą przyjęcia
Odstawienie Clopidogrel (plavix, Areplex)	Na 7 dni przed ustaloną datą przyjęcia
Odstawienie Ticlopidyna (Aclostin, Apo Clodin, Ticlo, Ifapidin)	Na 10-14 dni przed ustaloną datą przyjęcia
Odstawienie kwas acetylosalicylowy (Aspiryna, Acard, Polocard, Polopiryna)	Na 7 dni przed ustaloną datą przyjęcia