



PRZYJĘCIE DO SZPITALA

NA ODDZIAŁ: Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Informujemy, że przyjęcie do szpitala planowane jest..... o godz.

Na Centralną Izbę Przyjęć Pacjent stawia się na czczo.

Prosimy o zabranie:

Dowód osobisty	<input type="checkbox"/>
Dokumentacja medyczna (najlepiej kserokopie)	<input type="checkbox"/>
Wyniki badań (TK, Rezonans, RTG, USG,)	<input type="checkbox"/>
Wynik grupy krwi – oryginał lub potwierdzony odpis	<input type="checkbox"/>
Wykaz zażywanych leków wraz z dawkowaniem	<input type="checkbox"/>
Bandaż elastyczny 3 sztuki	<input type="checkbox"/>

Przybory toaletowe	<input type="checkbox"/>
Ręcznik	<input type="checkbox"/>
Pidżama - kilka sztuk	<input type="checkbox"/>
Wygodne wkładane obuwie	<input type="checkbox"/>
Szućce, kubek, talerzyk	<input type="checkbox"/>
Dres/ Ubranie zmienne	<input type="checkbox"/>
Woda mineralna niegazowana (butelka z tzw. dziubkiem)	<input type="checkbox"/>
Leki, które Pacjent zażywa (w oryginalnych opakowaniach)	<input type="checkbox"/>

Przygotowanie do zabiegu:

Do zabiegów endoprotez : - mocz w pojemniku na mocz - kule łokciowe	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Do zabiegów artroskopii : - kule łokciowe	<input type="checkbox"/>
Do zabiegów rekonstrukcji ACL : - stabilizator - kule łokciowe	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

ODSTAWIENIE LEKÓW P/ZAKRZEPYCH PRZED ZABIEGIEM/OPERACJĄ:

Uwaga! Odstawienie leków i włączenie heparyny drobnocząsteczkowej podskórnie odbywa się tylko i wyłącznie po konsultacji z lekarzem prowadzącym lub rodzinnym.

Heparynę drobnocząsteczkową stosuje się podskórnie w godzinach wieczornych.

Odstawienie Acenokumarol (Sitrom, Syncumar)	Na 5 dni przed ustaloną datą przyjęcia
Odstawienie Clopidogrel (plavix, Areplex)	Na 7 dni przed ustaloną datą przyjęcia
Odstawienie Ticlopidyna (Aclostin, Apo Clodin, Ticlo, Ifapidin)	Na 10-14 dni przed ustaloną datą przyjęcia
Odstawienie kwas acetylosalicylowy (Aspiryna, Acard, Polocard, Polopiryna)	Na 7 dni przed ustaloną datą przyjęcia